



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

NOTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA (SBOP) SOBRE BAIXA VISÃO E ESTIMULAÇÃO VISUAL

RELATORES

Christiane Rolim-de-Moura

Ana Carolina Sarmiento Carneiro

Ana Letícia Fornazieri Darcie

Ana Paula Silverio Rodrigues

Lucas Brandolt Farias

Luisa Moreira Hopker

Roberta Melissa Benetti Zagui

Júlia Dutra Rossetto

1. DEFINIÇÕES

a. BAIXA VISÃO (BV) E CEGUEIRA

Baixa visão é o termo usado para nomear a deficiência visual que não pode ser corrigida por óculos convencionais, lentes de contato ou por tratamento médico, clínico ou cirúrgico. A baixa visão pode resultar de muitas doenças oculares diferentes ou de distúrbios neurológicos.¹

A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma norma que subdivide a baixa visão de acordo com a acuidade visual e a extensão do campo visual (Classificação Organização Mundial de Saúde, 10ª revisão, 2003). Considera-se uma criança com baixa visão ou visão subnormal aquela cujo valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 20/70 (0,3) e maior ou igual a 20/400 (0,05) ou seu campo visual é menor do que 20° no melhor olho, com a melhor correção óptica. Esta definição de visão subnormal identifica aqueles que têm visão deficiente, mesmo após a terapia, e que potencialmente se beneficiam de auxílios especiais para visão subnormal e/ou de reabilitação para melhorar a sua qualidade de vida. A cegueira é definida nas situações em que a melhor visão é menor de 20/400 (0,05) e/ou o campo visual central é de no máximo 10°.

Recentemente, alguns investigadores adotaram um ponto de corte diferente para categorizar a deficiência visual (ou seja, uma acuidade visual inferior a 20/40 (0,5) no olho melhor)



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

em reconhecimento a um crescente conjunto de evidências, de que mesmo reduções mais leves na acuidade visual têm impacto no funcionamento diário dos indivíduos.²

b. REABILITAÇÃO NA BAIXA VISÃO

A reabilitação em pacientes com baixa visão, também conhecida como reabilitação visual, refere-se ao conjunto de estratégias e intervenções destinadas a maximizar a função visual remanescente de indivíduos que não podem ser completamente tratados por intervenções médicas, cirúrgicas ou ópticas convencionais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida através da otimização da visão residual, ensinar novas maneiras de realizar tarefas visuais e desenvolver a autonomia do paciente.

A programação da estimulação visual depende de uma avaliação individualizada multidisciplinar do desenvolvimento global da criança, de suas potencialidades e da presença ou não de visão funcional residual.^{3: 4} A partir daí, estabelecem-se estratégias a fim de incentivar a curiosidade e a motivação da criança em agir sobre o ambiente, estimulando-a a brincar e a se desenvolver.

Os recursos da habilitação e reabilitação visual são diversos, dadas as particularidades de cada paciente, o qual também está em constante transformação, com necessidades diferentes ao longo de seu crescimento.⁴ São exemplos de estratégias as adequações de luminosidade, contraste, tamanho e texturas; adaptação de materiais; adequação de estímulos à capacidade funcional; o estímulo ao esporte adaptado e orientações comportamentais à família, como posicionar-se no campo visual da criança e proporcionar tempo de exploração dos ambientes.

c. A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Segundo portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 2008, apesar de o oftalmologista ser o médico responsável pelo atendimento da criança com baixa visão, em um serviço de habilitação e reabilitação visual faz-se necessário contar com equipe multidisciplinar para que todos os aspectos da criança com baixa visão sejam abordados. A equipe multidisciplinar deve ser composta por profissionais capacitados na área de psicologia, assistência social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais da área de mobilidade e do ensino, como psicopedagogos e pedagogos.

2. EVIDÊNCIAS ATUAIS



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

Existem ainda poucos estudos sobre estimulação visual em crianças e terapias em baixa visão infantil, sendo notável a ausência de pesquisas que apresentem desenhos multicêntricos, randomizados e com grupo controle placebo, com desfechos mensuráveis na prática oftalmológica, tais como melhora da acuidade visual, melhora na visão funcional, medida de ofuscamento e contraste, medida do campo visual, teste de visão de cores ou outros utilizados na prática oftalmológica.⁵⁻⁹ (Nível 2+, C, baixa)

Assim sendo, os futuros estudos na área da terapêutica dos casos de baixa visão devem seguir o rigor científico, apresentados com métricas e análises estatísticas reproduzíveis e podem incluir os seguintes desfechos:

- **Melhora da acuidade visual**
- **Melhora no desempenho em testes visuais/melhora da performance visual/visão funcional** (medida de ofuscamento e contraste, medida do campo visual, teste de visão de cores)
- **Melhora no desenvolvimento neuropsicomotor**
- **Melhora na qualidade de vida por meio de questionários validados**

a. Terapias oftalmológicas com eficácia comprovada cientificamente

Além da avaliação oftalmológica convencional e consequente prescrição de lentes para correção de ametropias e auxílios ópticos para a melhoria funcional dos pacientes com baixa visão, os seguintes tratamentos apresentam evidência científica, classificada entre parênteses, conforme a classificação GRADE.¹⁰

i. Uso de lente de contato:

Um estudo retrospectivo mostrou que lentes de contato podem trazer uma melhor acuidade visual que correção com óculos em crianças com baixa visão de maneira estatisticamente significante, além de permitir redução da amplitude do nistagmo, ganho de campo visual e maior conforto.¹¹ (Nível de evidência 2-)

ii. Cirurgia de catarata para reabilitação visual na Baixa visão:

Em três séries de casos prospectivos, com tempos de segmentos variados, de pacientes adultos, com catarata clinicamente significativa, foi observada melhora na acuidade visual, capacidade de ler livros e melhora da mobilidade após cirurgia de catarata. A extração da catarata, quando há opacidade significativa, pode levar a melhora de performance visual, entre outros.¹²⁻¹⁴ Estes estudos não foram reproduzidos em crianças com cataratas clinicamente relevantes e baixa de visão. (Nível de evidência 2)

b. Terapias sem eficácia comprovada



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

Em um banco de dados médicos (PubMed), não foram encontrados artigos com os seguintes termos: "filtering prism lenses"; "visuopostural" AND "low vision", "visual relaxation"; "neural reframing" AND "low vision"; "corneal ring" AND "low vision; "modulated visual stimulation" AND "low vision", utilizados para designar possíveis terapias em baixa visão sem respaldo científico. Tampouco há estudos sobre a relação entre ler textos invertidos e ganho de campo visual.

Os estudos publicados sobre uso de lentes coloridas em baixa visão foram analisados em uma revisão de literatura. Entretanto, identificaram-se significativas limitações metodológicas nas pesquisas avaliadas, incluindo inadequado controle de viés, a não consideração do efeito de aprendizado e de fadiga, a falta de grupos controle em muitos dos estudos, bem como a ausência de metodologias duplo-cegas. Estas falhas comprometem a robustez dos resultados e, conseqüentemente, a capacidade de inferir conclusões científicas sólidas sobre a eficácia das lentes coloridas para pacientes com baixa visão.¹⁵

Uma revisão sistemática investigando a terapia sintônica e seus impactos nas funções visuais concluiu pela ausência de suporte científico que justifique sua aplicação no tratamento de sintomas visuais, campo visual, acuidade visual, sensibilidade ao contraste, distúrbios de motricidade, estereopsia e habilidade de leitura.¹⁶

O uso de estimulação elétrica não invasiva, em uma revisão sistemática de literatura, se mostrou eficaz como mecanismo de neuroproteção em doenças da retina. (Nível de evidência 1-).¹⁷ Contudo, o estudo das publicações sobre a estimulação elétrica e magnética do sistema visual para induzir plasticidade neuronal demonstrou que, ainda que a terapia seja mais efetiva que placebo nos grupos controles, a eficácia clínica é muito variável e parte dos pacientes não apresentam resposta.¹⁸ Dessa forma, mais estudos de ensaio controle, duplo-cegos, multicêntricos e randomizados devem ser realizados para a definição de protocolos de tratamento individualizados.

RECOMENDAÇÕES

REHABILITAÇÃO NA BAIXA VISÃO

Após a avaliação oftalmológica completa, a fim de minimizar prejuízos do neurodesenvolvimento e os impactos deletérios nas famílias das crianças, recomendamos o encaminhamento das crianças até os 3 anos para estimulação visual precoce tão logo seja feito o diagnóstico de baixa visão. Os oftalmologistas devem colaborar com a programação da terapia, especificando o motivo da baixa visão, a acuidade visual do paciente, seu potencial de visão, sensibilidade ao contraste, campo visual e visão de cores, além de fazer a reavaliação do paciente sempre que necessário.

A estimulação visual deve ser realizada por profissionais habilitados, notadamente com título de pós-graduação na área e experiência clínica significativa. Sempre que possível, a abordagem deve ser multidisciplinar, incluindo não só o médico oftalmologista e o terapeuta visual, mas também neurologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

METODOLOGIA DE GRADUAÇÃO DOS NÍVEIS DE EVIDÊNCIA USADA NESTE DOCUMENTO:

Os sistemas *GRADE* (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) e Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) foram utilizados para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações, conforme descrito abaixo:^{10; 19}

Níveis de evidências:

1++ Metanálises de alta qualidade, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) ou ECRs com risco muito baixo de viés;

1+ Metanálises bem conduzidas, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com baixo risco de viés;

1- Metanálises, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com alto risco de viés.

2++ Revisões sistemáticas de alta qualidade de estudos de caso-controle ou de coorte *ou*

Estudos de caso-controle ou de coorte de alta qualidade com risco muito baixo de confusão ou viés e alta probabilidade de que a relação seja causal;

2+ Estudos de caso-controle ou de coorte bem conduzidos, com baixo risco de confusão ou viés e probabilidade moderada de que a relação seja causal;

2- Estudos de caso-controle ou de coorte com alto risco de confusão ou viés e risco significativo de que a relação não seja causal;

3 Estudos não analíticos (por exemplo, relatos de casos, séries de casos);

4 Opinião de especialista.

Graus de recomendações:

A Pelo menos uma metanálise, revisão sistemática ou ECR classificado como 1++, ou uma revisão sistemática de ECRs, ou um conjunto de evidências consistindo principalmente de estudos classificados como 1+ e demonstrando consistência geral de resultados;

B Evidências incluindo estudos classificados como 2++ e demonstrando consistência geral dos resultados, ou evidências extrapoladas de estudos classificados como 1++ ou 1+;

C Evidências incluindo estudos classificados como 2+ e demonstrando consistência geral dos resultados, ou evidências extrapoladas de estudos classificados como 2++;

D Nível de evidência 3 ou 4, ou evidência extrapolada de estudos classificados como 2+.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

Qualidade da evidência e definições:³⁸

Alta qualidade: É muito improvável que mais pesquisas mudem nossa confiança na estimativa do efeito;

Moderada qualidade: É provável que pesquisas futuras tenham um impacto importante na nossa confiança na estimativa do efeito e possam alterar a estimativa;

Baixa qualidade: É muito provável que mais pesquisas tenham um impacto importante na nossa confiança na estimativa do efeito e provavelmente alterem a estimativa;

Qualidade insuficiente: Qualquer estimativa do efeito é muito incerta.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Profa. Dra. Marcia Caires Bestilleiro Lopes pela contribuição na elaboração desta nota.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

DIRETORIA 2023-2025

PRESIDENTE

Dra. Júlia Dutra Rossetto

Dra. Christiane Rolim-de-Moura

Dra. Cristiana L Ronconi

SECRETÁRIA

Dra. Luiza M. Neves

Dra. Ana Letícia Fornazieri Darcie

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA



SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

REFERÊNCIAS

1. Rucker JC, Phillips PH. 2018. Efferent vision therapy. *J Neuroophthalmol.* 38(2):230-236.
2. Dandona L, Dandona R. 2006. Revision of visual impairment definitions in the international statistical classification of diseases. *BMC Med.* 4:7.
3. Souza AGM AR. 2005. A atuação da terapia ocupacional na intervenção precoce de crianças com baixa visão utilizando a estimulação visual. *Temas sobre desenvolvimento.* p. 29-34.
4. Gagliardo HGRG, & Nobre, M. I. R. S. 2001. Intervenção precoce na criança com baixa visão. *Revista Neurociências* . 9(1):16–19.
5. Messa AA, Nakanami CR, Lopes MC. 2012. [quality of life in visual impaired children treated for early visual stimulation]. *Arq Bras Oftalmol.* 75(4):239-242.
6. Brandão AO, Andrade GM, Vasconcelos GC, Rossi LD, Saliba GR. 2017. Instruments for evaluation of functionality in children with low vision: A literature review. *Arq Bras Oftalmol.* 80(1):59-63.
7. Thomas R, Barker L, Rubin G, Dahlmann-Noor A. 2015. Assistive technology for children and young people with low vision. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015(6):CD011350.
8. Barker L, Thomas R, Rubin G, Dahlmann-Noor A. 2015. Optical reading aids for children and young people with low vision. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015(3):CD010987.
9. Chavda S, Hodge W, Si F, Diab K. 2014. Low-vision rehabilitation methods in children: A systematic review. *Can J Ophthalmol.* 49(3):e71-73.
10. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Group GW. 2008. Grade: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ.* 336(7650):924-926.
11. Ozcelik F, Ozturk Karabulut G, Ocak OB. 2020. The efficacy of low vision aids with contact lenses in pediatric population. *Int Ophthalmol.* 40(10):2677-2681.
12. Kuo IC, Broman AT, Massof RW, Park W. 2011. The impact of cataract surgery on patients from a low-vision clinic. *Can J Ophthalmol.* 46(5):391-398.e391.
13. Mönestam E, Wachtmeister L. 1997. The impact of cataract surgery on low vision patients. A population based study. *Acta Ophthalmol Scand.* 75(5):569-576.
14. Mönestam EI, Lundqvist BM, Jonsson AC. 2008. Long-time visual functional results of cataract surgery on low vision patients. *Clin Ophthalmol.* 2(1):187-194.
15. Eperjesi F, Fowler CW, Evans BJ. 2002. Do tinted lenses or filters improve visual performance in low vision? A review of the literature. *Ophthalmic Physiol Opt.* 22(1):68-77.
16. Cervera-Sánchez Z, Cacho-Martínez P, García-Muñoz Á. 2023. Efficacy of optometric phototherapy: A systematic review. *J Optom.* 16(4):305-314.
17. Li J, Zhou W, Liang L, Li Y, Xu K, Li X, Huang Z, Jin Y. 2024. Noninvasive electrical stimulation as a neuroprotective strategy in retinal diseases: A systematic review of preclinical studies. *J Transl Med.* 22(1):28.
18. Sabel BA, Thut G, Haueisen J, Henrich-Noack P, Herrmann CS, Hunold A, Kammer T, Matteo B, Sergeeva EG, Waleszczyk W et al. 2020. Vision modulation, plasticity and restoration using non-invasive brain stimulation - an ifcn-sponsored review. *Clin Neurophysiol.* 131(4):887-911.



CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

19. Harbour R, Miller J. 2001. A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. BMJ. 323(7308):334-336.